

< 質量と重心 2 >

例 野球のバットのような立体 (図 1) を考える。中心軸 (x 軸) に垂直な断面の断面積 $S(x)$ が分かっている場合、この立体の体積 V は

$$V = \int_a^b S(x) dx$$

であった。もしこのバットの材質が均一であれば、その質量 M は体積の定数倍 (K 倍) になると考えられるので

$$M = KV = \int_a^b KS(x) dx$$

と表される。この場合被積分関数 $KS(x)$ をこの立体の質量分布の密度関数という。

この立体の重心 G の位置 g (図 2) を求めたい。

区間 $[a, b]$ を n 等分して、その分点を

$$a = x_0, x_1, \dots, x_n = b$$

とおき、それぞれ

$$m_1, m_2, \dots, m_n$$

のおもりがかかっているとする (図 3)。

このとき $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ とすると

$$m_k = \int_{x_{k-1}}^{x_k} KS(x) dx \doteq KS(x_k) \Delta x \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

である。前ページの結果より

$$g = \frac{1}{M} \{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots + m_n x_n\} \doteq \frac{1}{M} \{x_1 KS(x_1) + \dots + x_n KS(x_n)\} \Delta x$$

である。 $n \rightarrow \infty$ とすれば定積分の区間求積法による定義から

$$g = \frac{1}{M} \int_a^b xKS(x) dx = \frac{1}{\int_a^b KS(x) dx} \int_a^b xKS(x) dx$$

となる。

